

تنوع ژنتیکی ژن استافیلوکوآگولاز ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از عفونت‌های ادراری و خون

چکیده

دربافت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ویرایش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ آنلاین: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل بیماری‌زا در انسان است که طی گستردگی از بیماری‌ها را ایجاد می‌کند. آنزیم کوآگولاز از عوامل مهم بیماری‌زا این باکتری می‌باشد. همچنین بررسی تنوع ژنتیکی ژن کدکننده این آنزیم (Coa) یکی از روش‌های مولکولی تعیین تیپ ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، از اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ ۱۵۰ نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های ادرار و خون از بیمارستان‌های آموزشی الزهرا و امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از تأیید نوع باکتری نمونه با قطعه ژنومی Coa، برای تعیین تیپ کوآگولاز منطقه بسیار متغیر ژن این آنزیم در واکنش Polymerase chain reaction (PCR) تکثیر و سپس مورد هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم اندونوکلئاز محدودگر AluI قرار گرفت و تنوع طول قطعات هضم آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: از ۱۵۰ نمونه ۴۵ نمونه استافیلوکوکوس اورئوس با تست‌های بیوشیمیابی تأیید و از این تعداد (۳۶٪) نمونه‌ها حامل ژن کوآگولاز بودند. در بین الگوهای PCR، الگوی bp680 در ۲۰ نمونه و الگوی bp750 در ۱۶ نمونه به دست آمدند. پس از هضم آنزیمی برای آزمون (RFLP)، الگوی ۴۷۰+۲۸۰ در ۷ نمونه (۴٪)، الگوی ۳۴۰+۳۴۰ در ۶ نمونه (۴٪)، الگوی بدون هضم ۷۵۰ در ۷ نمونه (۴٪) می‌باشدند.

نتیجه‌گیری: با استفاده از آزمایشات صورت گرفته مشخص گردید که الگوی PCR-RFLP، ۴۰۰+۲۸۰ جفت بازی الگوی غالب در نمونه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده در اصفهان می‌باشد.

کلمات کلیدی: کوآگولاز، پژوهش‌های مقطعی، ژنوتیپ، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، استافیلوکوکوس اورئوس.

مهرداد محمدی*

جمشید فقری

گروه میکروب و ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

*توسطنده مسئول: اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه باکتری‌شناسی و ویروس‌شناسی.
تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۲۹۰۲۱

E-mail:
mehrdad.mohammadi1984@gmail.com

بیمارستانی باقی مانده‌اند. آن‌ها مسئول بیش از ۸۰٪ از بیماری‌های چرکی می‌باشند که در بالین بیمار یافت می‌شوند و پس از اشرشیاکلی، دومین علت عفونت‌های بیماران بستری در بیمارستان را به خود اختصاص می‌دهند. از میان ۲۰ گونه استافیلوکوک، فقط ۳ گونه از آن‌ها: استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اپیکرمیس و استافیلوکوک ساپروفیتیکوس اهمیت بالینی دارند. امروزه عفونت‌های ایجاد شده به وسیله استافیلوکوک اورئوس‌های مقاوم به متی‌سیلین

مقدمه

استافیلوکوک تنها جنس در خانواده میکروکاسیه می‌باشد که اهمیت پزشکی دارد. آن‌ها رایج‌ترین ارگانیسم‌ها در پزشکی هستند. با وجود عرضه عوامل ضدمیکروبی و بهبودی بهداشت (که نقش موثری در کاهش شیوع و مرگ‌ومیر بیماری‌های استافیلوکوکی در قرن بیستم داشته است) هنوز استافیلوکوک‌ها به عنوان بیماری‌ Zahای مهم

استفاده قرار گیرد. تفاوت‌های ناشی از این چند شکل‌ها می‌تواند به دلیل تفاوت در میزان پاتوژن و یا تفاوت در مخازن این باکتری باشد.^{۴,۵}

استفاده از تکنیک PCR-RFLP و هضم آنزیمی ژن کواگولاز به دلیل سهولت و سرعت بالا به طور گسترده‌ای جهت تعیین ژنتیپ جدایه‌های بالینی در آزمایشگاه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش PCR-RFLP یک روش مناسب جهت طبقه‌بندی نمونه‌های مختلف استافیلولوکوك اورئوس می‌باشد. این روش افزون بر ارایه نتایج آسان، ارزان و مناسب جهت مطالعات اپیدمیولوژیک، قادر به تمایز بین گونه‌های اپیدمیک و اسپورادیک در جنس خاصی از باکتری‌ها می‌باشد.^۶

روش آنتی‌بیوگرام و ارتباط این تست با الگوهای PCR و RFLP ژن Coa یک روش مناسب جهت تایپینگ مولکولی می‌باشد، ولی مشکلی که این روش دارد این است که ژن‌های مربوط به مقاومت ممکن است خارج کروموزومی باشد. بنابراین جهت تایپینگ با این روش فقط ژن‌های مقاومت داخل کروموزومی (ژن A در MRSA) این پتانسیل را از خود نشان می‌دهند.^۷
در پژوهش حاضر ۱۵۰ نمونه استافیلولوکوكوس اورئوس از نظر پلی‌مورفیسم در ژن Coa بررسی، وجود و عدم وجود ارتباط معنادار بین ژنتیپ Coa و نوع عفونت بالینی (موقعی یا سیستمیک بودن آن) بررسی گردید.

روش بررسی

نمونه‌های بالینی استافیلولوکوكوس اورئوس از نمونه‌های خون، ادرار بیماران مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های مراکز درمانی الزهرا و امام حسین (ع) شهر اصفهان از اسفند ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۷، جمع‌آوری گشته و به آزمایشگاه منتقل گردید. یک کلنج از باکتری مورد مطالعه بر محیط به صورت خطی کشت داده شد. پس ۲۴ تا ۴۸ ساعت انکوباسیون، در حرارت 37°C انکوبه گردید. در این محیط در نتیجه تخمیر مانیتور در اطراف کلنج‌های استافیلولوکوك اورئوس هاله زرد رنگ مشاهده می‌گردد.

روی یک گوشه از لام شیشه‌ای یک قطره سرم فیزیولوژی را به عنوان کنترل و در گوشه دیگر یک قطره پلاسما قرار داده شد. با لوب

چالش بزرگی برای سیستم بهداشت و درمان بوده و میزان بسیار بالایی از مرگ‌ومیر بیمارستانی را به خود اختصاص داده است.^{۱-۳}

تایپینگ مولکولی می‌تواند نقش بسزایی را در مطالعات اپیدمیولوژیک عفونت‌های بیمارستانی بازی کند. با آگاهی از این مطلب در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته ژنتیپینگ بخش چشمگیری از مطالعات سیستم بهداشت و درمان را به خود اختصاص داده تا از آن‌ها در کنترل عفونت‌ها بهره ببرند.^۴

مولکولار تایپینگ نقش اساسی در مطالعات اپیدمیولوژیک عفونت‌های فرصت‌طلب ناشی از استافیلولوکوكوس اورئوس دارد. در سال‌هال اخیر روش‌های متنوع از تکنیک‌های مولکولی برای ژنتیپینگ ارایه شده‌اند همانند الکتروفورز پالس‌فیلد، الکتروفورز آنزیمی با لوکوس متعدد (MLLE)، تیپ‌بندی با ژن Spa و ژنتیپ‌بندی کواگولاز.^۵ روش الکتروفورز پالس‌فیلد هرچند کارترین روش تایپینگ مولکولی می‌باشد ولی تکنیک پیچیده، گران و زمانبر است. به همین دلیل تلاش‌هایی در جهت دست‌یابی به تکنیک‌های ساده، سریع و ارزان انجام پذیرفت. مطالعات مختلف نشان داد تکثیر مناطق ژنی بسیار متغیر و آنالیز هضم آنزیمی محصول Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism، PCR-RFLP) روش‌های کارا در تایپینگ مولکولی استافیلولوکوكوس اورئوس می‌باشد.^۶

ژن Coa که پروتئین کواگولاز را کد می‌کند به علت داشتن توالی‌های متغیر در ناحیه کدکننده^۳ بسیار پلی‌مرف است و می‌تواند در متایزیز کردن جدایه‌های این باکتری مورد استفاده قرار گیرد. ناحیه متغیر ژن Coa از توالی‌های تکراری ۸۱ جفت بازی تشکیل شده است که تعداد تکرار این توالی‌ها در سویه‌های مختلف استافیلولوکوكوس متغیر است. در بسیاری از کشورها تعیین ژنتیپ استافیلولوکوكوس اورئوس بخشی از برنامه‌های سیستم‌های نظارتی بوده و ابزار مهمی در مطالعه خواستگاه سویه‌ها، تعیین ارتباط کلون‌ها و اپیدمیولوژی مواد شیوع است.^۷

به دلیل وجود چند شکلی در ژن کواگولاز که با تکنیک PCR-RFLP قابل ردیابی است می‌توان نتیجه گرفت که این روش می‌تواند در مطالعه ژنتیپ باکتری استافیلولوکوكوس اورئوس به منظور ردیابی منبع و خواستگاه این چند شکل‌ها برای اهداف اپیدمیولوژیک، مورد

حباب‌های گاز اکسیژن مورد بررسی قرار می‌گیرد. حباب‌های مشاهده شده نشان‌دهنده وجود آنزیم کاتالاز در میکروگانیسم است که موجب شکسته شدن پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن می‌گردد. باکتری مورد مطالعه در محیط DNase test agar به صورت لوب پر کشت داده شده، سپس پلیت‌ها به مدت ۱۸ تا ۲۴ ساعت در دمای ۳۷°C انکوبه می‌گردند. پس از انکوباسیون، روی پلیت‌های DNase test agar ساده، معرف تولوئیدین بلو ۰/۱٪ ریخته و سطح پلیت به‌طور کامل با این ماده پوشانده می‌شود. در نمونه‌های مثبت هاله‌های شفاف کاملاً مشخصی اطراف کلنی یا محل تلقیح در محیط کشت مشاهده می‌گردد.

جهت استخراج از کیت استخراج DNA باکتری‌های گرم مثبت Genomic DNA extraction kit, CinnaGen, Tehran, Iran, Cat. # (PR881614) استفاده گردید. براساس دستورکار کیت، از کشت ۲۴ ساعته باکتری در محیط نوترینت آکار استفاده گردید. در این آزمایش از پرایمرهای اختصاصی جهت شناسایی نهایی باکتری استافایلوکوک اورئوس با استفاده از ژن کواگلاز و تایید آن با استفاده قطعه ژنومی ۲۳S rRNA با تکنیک PCR استفاده گردید (جدول ۱).^۸

استریل مقداری از کلنی باکتری در هر یک از دو قطره مخلوط گردید تا سوپسیسیون یکنواختی تهیه گردد. سپس از نظر تشکیل لخته هر دو قطره بررسی گردید. استافایلوکوک اورئوس موجب تجمع سریع و تشکیل لخته در لام می‌گردد. در صورتی که سوپسیسیون در شکل یک محلول شیری رنگ صاف و یکنواخت باقی بماند نشان از منفی بودن تست دارد.

۳-۴ ml پلاسمای حاوی ضد انعقاد انسان در یک لوله آزمایش استریل ریخته شد. باکتری مورد مطالعه در آن کشت داده شد و به مدت ۱ تا ۴ ساعت در دمای ۳۷°C نگهداری و مرتب از نظر تشکیل لخته در لوله آزمایش گردید. اگر پس از این مدت زمان تشکیل لخته در لوله آزمایش مشاهده نشد. برای یک شب در حرارت اتاق باقی می‌گذاریم. ارگانیسم‌هایی که نتوانند پلاسما را در مدت ۲۴ ساعت لخته کنند به عنوان کواگلاز منفی در نظر گرفته می‌شوند.

با استفاده از اپلیکاتور چوبی، مقدار کمی از کشت خالص ارگانیسم از محیط آکار مغذی به سطح یک لام خشک و تمیز منتقل می‌گردد. بالاصله یک قطره از پراکسید هیدروژن (H₂O₂) بر روی کلنی‌های موجود بر روی سطح لام ریخته از نظر آزاد شدن

جدول ۱: سکانس‌های پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثیر ژن‌های *Coa* و ۲۳S rRNA در استافایلوکوک اورئوس

منبع	اندازه محصول واکنش (bp)	نوالی‌های پرایمرها (5'-3')	جفت پرایمرهای مورد استفاده
و همکاران ^{۱۳}			<i>Coa</i> forward
	۶۷۳	ATA GAG ATG CTG GTA CAG G	<i>Coa</i> reverse
و همکاران ^{۱۳}	۱۲۵۰	GCT TCC GAT TGT TCG ATG C ACGGAGTTACAAGGACGAC AGCTCAGCCTAACGAGTAC	23Sr RNA forward primer 23S r RNA reverse primer

دمای اتصال برای تکثیر هر دو ژن ۵۷°C در نظر گرفته شد.

جدول ۲: برنامه دستگاه ترموسایکلر جهت تکثیر ژن *Coa* / ۲۳S rRNA

نام مرحله	دما (°C)	زمان (دقیقه)	تعداد تکرار چرخه
Initial Denaturation	۹۴	۴	یک بار
Denaturation	۹۴	۱	۳۰ بار
Annealing	۵۷	۱	
Extention	۷۲	۱	
Final extention	۷۲	۱۰	یک بار

اورئوس شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت. درصد فراوانی باکتری های جدا شده از نمونه های بالینی ادرار ۲۶/۶٪ و از نمونه های خون برابر با ۲۱٪ می باشد.

تمامی ۴۵ نمونه استافیلولوکوک اورئوس با استفاده از PCR زن rRNA 23S مورد شناسایی مولکولی قرار گرفتند که پس از الکتروفورز ژل آکارز باندهایی با وزن مولکولی کمابیش ۱۲۵۰ جفت باز حاصل شد.

از تکثیر منطقه متغیر زن کوآگولاز ۳۶ بالینی استافیلولوکوکوس اورئوس در واکنش PCR دو دسته محصول با طول باند bp680 (٪.۵۶)، که از ۲۰ نمونه به دست آمده ۵ نمونه از کشت خون و ۱۵ نمونه از ادرار می باشد و bp750 (٪.۴۴) که از ۱۶ نمونه به دست آمده، ۱۱ نمونه از کشت خون و ۵ نمونه از کشت ادرار می باشد، به دست آمدند (شکل ۲).

از هضم محصولات PCR منطقه متغیر زن *Coa* ۳۶ جدایه استافیلولوکوکوس اورئوس با استفاده از آنزیم Alu I در نهایت ۴ الگوی مختلف مشاهده گردید (شکل ۳ و ۴). فراوانی این الگوهای به دست آمده از نمونه ها بدین صورت می باشد که -۱ الگوی ۴۰۰+۲۸۰ در ۶ نمونه (٪.۴۴/۴)، -۲ الگوی ۴۷۰+۲۸۰ در ۷ نمونه (٪.۱۹/۴)، -۳ الگوی ۳۴۰+۳۴۰ در ۶ نمونه (٪.۱۶/۶)، -۴ الگوی بدون هضم ۷۵۰ در ۷ نمونه (٪.۱۹/۶).

تست آنتی بیوتیک بر روی تمامی نمونه های مورد نظر از استافیلولوکوک اورئوس ها انجام پذیرفت که نتایج درصد مقاومت هر یک از نمونه های مختلف نسبت به آنتی بیوتیک های مورد استفاده به صورت زیر می باشد:

کلیندامایسین ۲۳٪، سفارزولین ۱۰٪، جنتامایسین ۱۰٪، کلوگراسیلین ۵۳٪، آمپی سیلین ۷۳٪، نیتروفلوکسازین، و نکومایسین ۷٪، کوتريموکسازول ۳٪، سپروفلوکسازین ۱۷٪، اریترومایسین ۴٪، سفالکسین ۱۳٪، متی سیلین ۷۵٪، آموکسی سیلین ۶۰٪، آموکسی کلاو ۲۷٪، سفالتین ۴۷٪، تتراسایکلین ۲۰٪.


در بین الگوهای PCR: الگوی bp680 که در ۲۰ نمونه مشاهده شده بود، ۱۲ نمونه (٪.۶۰) مقاوم به متی سیلین بودند و الگوی bp750 که در ۱۶ نمونه مشاهده شده بود، هشت نمونه (٪.۵۰) مقاوم به متی سیلین بودند و در بین الگوهای RFLP: الگوی ۴۰۰+۲۸۰ که در ۱۶ نمونه مشاهده شده بود هشت نمونه (٪.۵۰) مقاوم به متی سیلین

در این آزمایش از آنزیم AluI (Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA) استفاده گردید. AluI در نواحی از ژن که دارای توالی AGCT باشد بین بازه های G و C برش ایجاد می کند. مقدار ۱۰ μl از محصول PCR درون میکروتیوب های ۲۰۰ میکرولیتری ریخته شد، سپس ۱۸ آب Nuclease-free AluI آنزیم و ۱۰X Buffer Tango هر کدام ۲ μl به آن اضافه گردید. پس از مخلوط کردن اجزای واکنش میکروتیوب به مدت ۱۶ ساعت، در دمای ۳۷ °C انکوبه گردید. پس از ۱۶ ساعت ویال به مدت ۲۰ دقیقه در بن ماری ۶۵ °C قرار گرفت تا فعالیت آنزیم AluI مهار گردد. در نهایت محصول با انجام عمل الکتروفورز بر روی ژل آکارز مشاهده گردید.^۹


در ابتدا حدود ۵ cc از محیط کشت مولر هیتون براث درون لوله آزمایش ریخته و استریل شد. سپس به منظور ایجاد کدورت ۰/۵ مک فارلن مقداری از کشت ۲۴ ساعته باکتری با استفاده از لوب استریل در این محیط تلقیح شد. در مرحله بعدی سواب استریل را به محیط کشت نوترینت براث حاوی باکتری مورد نظر وارد کرده سپس به صورت چمنی بر روی محیط مولر هیتون آکار کشت انجام گردید. سپس بلا فاصله با استفاده از پنس استریل دیسک های آنتی بیوتیک (شرکت پادتن طب) شامل: کلیندامایسین، سفارزولین، جنتامایسین، کلوگراسیلین، آمپی سیلین، نیتروفلوکسازین، و نکومایسین، کوتريموکسازول، سپروفلوکسازین، اریترومایسین، سفالکسین، متی سیلین، آموکسی سیلین، آموکسی کلاو، سفالتین و تتراسایکلین بر روی محیط مولر هیتون آکار قرار داده شدند. این دیسک ها به فاصله ۲ cm از دیسک مجاور و ۲ cm از لبه پلیت بر روی محیط کشت قرار داده شدند. سپس محیط کشت مورد نظر به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ °C قرار گرفت. پس از ۲۴ ساعت میزان مقاومت یا حساسیت باکتری ها با اندازه گیری قطر حاله عدم رشد مشخص گردید.

یافته ها

در این بررسی ۴۵ نمونه از باکتری های کوکسی گرم مشت تخمیر کننده مانیتول در محیط مانیتول سالت آگار با قابلیت تولید آنزیم های کاتالاز، کوآگولاز، همولیزین و DNase به عنوان استافیلولوکوکوس



شکل ۴: الگوی $400+280$ و $340+340$ RFLP. ستون ۱: مارکر. ستون ۴، ۲ و ۵ باند bp340. باند ۳: bp400+280




شکل ۱: الکتروفورز محصول PCR ژن 23S rRNA باکتری استافیلوکوکوس اورئوس. ستون ۱: مارکر، ستون های ۲ تا ۵: محصول PCR نمونه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس

بودند، الگوی $bp470+280$ که در هفت نمونه مشاهده گردیده بود هر هفت نمونه (100%) نسبت به متی سیلین مقاوم بودند، الگوی $bp750$ که در هفت نمونه مشاهده گردیده بود شش نمونه (85%) نسبت به متی سیلین مقاوم بودند و در نهایت الگوی $bp340$ که در شش نمونه مشاهده شده بود هر شش نمونه (100%) نسبت به متی سیلین مقاوم بودند.


بحث

الگوی های ژنتیکی به دست آمده در این مطالعه جزو الگوهای غالب در مطالعات مختلف چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان می باشند (البته با تفاوت $20 \pm$ ٪ باز).

از الگوهای مشاهده شده در پژوهش های انجام گرفته در کشور ایران می توان به یافته های Saei و همکاران اشاره کرد که الگوی 680 و 780 PCR را گزارش داده اند.¹⁰ همچنین Momtaz و همکاران الگوی 730 جفت بازی را گزارش داده اند.¹¹ آخرین مطالعه در ایران گزارش Motamedifar و همکاران می باشد که از دو هضم آنزیمی استفاده کرده اند و آنها را با هم مقایسه کرده و در بخش های مجرزا تحلیل و گزارش خود را ارایه داده اند.¹² در سایر نقاط جهان Hookey و همکاران الگوی 660 جفت بازی، Janwithayanuchit و همکاران الگوهای 654 و 735 جفت بازی، Aslantas و همکاران الگوی 730 جفت بازی، Moon و همکاران الگوی 670 جفت بازی و Sanjiv و



شکل ۲: الکتروفورز محصول PCR منطقه متغیر ژن *Coa*. ستون ۱ و ۲: مارکر، ستون ۳: باند bp680. ستون ۴: باند bp750



شکل ۳: الکتروفورز الگوی $280+470$ و $340+340$ RFLP. ستون ۱: مارکر bp100. ستون ۲: باند bp340. ستون ۴: باند bp280+470

باتوجه به یافته‌های Tiwari و همکارانشان می‌توان به این نتیجه رسید که یک زیر مجموعه ژنتیکی در نمونه‌های استافیلوكوک اورئوس به طور ویژه برای ایجاد عفونت در نقاط مختلف بدن به خوبی سازگار شده است. این در حالی است که نوع سازگاری‌های ژنتیکی بین گونه‌های مختلف از باکتری‌ها به طور چشمگیری می‌تواند متفاوت باشد و عوامل مختلفی ممکن است در این نوع سازگاری نقش داشته باشد.

در مورد ارتباط الگوهای PCR و RFLP و حساسیت و مقاومت نمونه‌ها نسبت به متی‌سیلین، ۵٪ از نمونه‌های دارای الگوی PCR جفت بازی و ۷٪ از نمونه‌های دارای الگوی PCR ۶۸۰ جفت بازی نسبت به متی‌سیلین مقاومت نشان دادند.

در بین الگوهای RFLP، نمونه‌های دارای الگوی ۴۷۰+۲۸۰ حاصل هضم آنزیمی الگوی PCR ۷۵۰ جفت بازی نسبت به متی‌سیلین مقاومت ۱۰۰٪ را از خود نشان دادند و در الگوی RFLP نمونه‌های دارای الگوی ۴۰۰+۲۸۰ حاصل هضم آنزیمی الگوی PCR ۶۸۰ جفت بازی مقاومت ۵۰٪ را نسبت به متی‌سیلین از خود نشان دادند.

در مطالعات مشابه انجام گرفته توسط Hookey و همکاران، پس از انجام عمل هضم آنزیمی ژن Coa بر روی باکتری‌های مختلف، ۱۰ الگوی متفاوت ایجاد گردید که از میان این ۱۰ الگو، ۴ الگو فقط در نمونه‌های MRSA مشاهده گردید.^{۱۳}

همچنین در مطالعات Boswihi و Janwithayanuchit و Tiwari و همکارانشان غالیت نسبی الگوهای PCR-RFLP خاص در نمونه‌های MRSA مشاهده گردید.^{۱۴} ۲۲٪ از مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گیری کرد که تکنیک PCR-RFLP روشی آسان جهن تعیین تیپ‌های استافیلوكوک اورئوس‌های مقاوم به متی‌سیلین بوده و نتایج بیانگر تنوع ژن کواگولاز در نمونه‌های استافیلوكوکوس اورئوس در منطقه اصفهان می‌باشد و الگوی PCR-RFLP ۴۰۰+۲۸۰ جفت بازی الگوی غالب بوده است.

سپاسگزاری: این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی به عنوان "بررسی الگوی توزیع ژنتیکی ژن‌های کواگولاز در بیماری‌های عفونی منطقه مرکزی ایران" مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در سال ۱۳۹۷ به کد ۳۹۹۴۲۰ می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرا شده است.

همکاران الگوی ۶۸۰ جفت بازی را مشاهده کرده‌اند.^{۱۳-۱۷} البته در مطالعاتی که در نقاط مختلف جهان در مورد پلی‌مورفیسم ژن Coa انجام پذیرفته کمایش ۴ و یا بیش از ۴ الگوی ژنتیکی حاصل از واکنش PCR مشاهده گردیده است که این تعداد در چند شکلی‌ها ممکن است به دلیل تعداد نمونه‌های بالا در مطالعات ذکر شده باشد. در مطالعه حاضر در بین ۴ الگوی مشاهده شده حاصل از واکنش RFLP، بیشترین شیوع مربوط به الگوی ۴۰۰+۲۸۰ و کمترین شیوع، مربوط به الگوی ۴۷۰+۲۸۰ می‌باشد. که الگوهای کمایش مشابه با این دو ژنتوتایپ در مطالعات Momtaz و همکاران که الگوی ۴۹۰+۲۴۰ و همکاران که الگوی ۴۹۰+۲۴۰ را مشاهده کرده‌اند به چشم خورده است.^{۱۱-۱۵}

الگوی تک بانده ۳۴۰ جفت بازی (حاصل هضم آنزیمی محصول PCR ۶۸۰ جفت بازی) که نشان‌دهنده ۲ باند روی هم افتد و ۳۴۰ جفت بازی می‌باشد که نمونه این نوع الگو در مطالعات Sanjiv و همکاران با الگوی تک باند ۳۰۰ جفت بازی که حاصل هضم آنزیمی الگوی PCR ۶۰۰ جفت بازی می‌باشد مشاهده گردیده است.^{۱۷} در نهایت الگوی بدون هضم ۷۵۰ جفت بازی که این عدم هضم احتمالاً به دلیل وجود جهش در ناحیه برش ژن Coa توسط آنزیم محدود کننده AluI می‌باشد که نمونه این نوع الگوهای بدون هضم در مطالعات Tel Güler و همکاران مشاهده گردیده است.^{۱۸} از لحاظ وجود ارتباط بین الگوهای PCR و RFLP با محل ضایعه، پراکندگی الگوهای یاد شده در محل‌های ضایعه مختلف مشاهده گردید و این امر نشان دهنده عدم ارتباط معنادار بین محل ضایعه و الگوهای موردنظر می‌باشد که این یافته‌ها با پژوهش‌های Talebi-Satlou و همکاران همخوانی نداشت. در مطالعات آن‌ها حدود ۷۰٪ از عفونت‌های پوست و دستگاه ادراری به یک الگوی ژنتیکی خاص مربوط می‌شد که غالیت بالای یک الگوی ژنتیکی در محل‌های ضایعه خاص را نشان می‌دهد.^{۲۰}

همچنین Tiwari و همکاران ارتباط بین الگوهای ژنتیکی به دست آمده را با نوع باکتری (مقاوم یا حساس به متی‌سیلین)، محل ضایعه و بخش‌های مختلف بیمارستان که نمونه‌های موردنظر از آن بخش به دست آمده بودند را مورد مطالعه قرار دادند و با توجه به نوع پراکندگی الگوهای به دست آمده در بخش‌های مختلف، روش PCR-RFLP را یک روش مناسب جهت تایپینگ مولکولی مطرح کردند.^{۲۱}

References

- Effendi MH, Hisyam MAM, Hastutiiek P, Tyasningsih W. Detection of coagulase gene in *Staphylococcus aureus* from several dairy farms in East Java, Indonesia, by polymerase chain reaction. *Vet World* 2019;12(1):68-71.
- Javid F, Taku A, Bhat MA, Badroo GA, Mudasir M, Sofi TA. Molecular typing of *Staphylococcus aureus* based on coagulase gene. *Vet World* 2018;11(4):423-430.
- Moura GS, Gebreyes WA, Marques MFS, Stipp DT, Souza FN, Da Costa LB, et al. Short communication: Occurrence of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* and coagulase-negative staphylococci in dairy goat herds in Ohio, United States. *J Dairy Sci* 2018;101(9):7804-7807.
- Brown DF, Edwards DI, Hawkey PM, Morrison D, Ridgway GL, Towner KJ, et al; Joint Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy; Hospital Infection Society; Infection Control Nurses Association. Guidelines for the laboratory diagnosis and susceptibility testing of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA). *J Antimicrob Chemother* 2005;56(6):1000-18.
- Gemmell CG, Edwards DI, Fraize AP, Gould FK, Ridgway GL, Warren RE; Joint Working Party of the British Society for Joint Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy, Hospital Infection Society and Infection Control Nurses Association. Guidelines for the prophylaxis and treatment of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) infections in the UK. *J Antimicrob Chemother* 2006;57(4):589-608.
- Duckworth GJ, Lothian JL, Williams JD. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: report of an outbreak in a London teaching hospital. *J Hosp Infect* 1988;11(1):1-15.
- Himabindu M, Muthamilselvan DS, Bishi DK, Verma RS. Molecular analysis of coagulase gene polymorphism in clinical isolates of methicillin resistant *Staphylococcus aureus* by restriction fragment length polymorphism based genotyping. *Am J Infect Dis* 2009;5:170-6.
- Mitani N, Koizumi A, Sano R, Masutani T, Murakawa K, Mikasa K, et al. Molecular typing of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* by PCR-RFLP and its usefulness in an epidemiological study of an outbreak. *Jpn J Infect Dis* 2005;58(4):250-2.
- Shi D, Higuchi W, Takano T, Saito K, Ozaki K, Takano M, et al. Bullous impetigo in children infected with methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* alone or in combination with methicillin-susceptible *S. aureus*: analysis of genetic characteristics, including assessment of exfoliative toxin gene carriage. *J Clin Microbiol* 2011;49(5):1972-4.
- Saei HD, Ahmadi M, Mardani K, Batavani RA. Molecular typing of *Staphylococcus aureus* isolated from bovine mastitis based on polymorphism of the coagulase gene in the north west of Iran. *Vet Microbiol* 2009;137(1-2):202-6.
- Momtaz H, Tajbakhsh E, Rahimi E, Momeni M. Coagulase gene polymorphism of *Staphylococcus aureus* isolated from clinical and sub-clinical bovine mastitis in Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari provinces of Iran. *Comp Clin Path* 2010;20(5):519-22.
- Khoskharam-Roodmajani H, Sarvari J, Bazargani A, Kandekar-Ghahraman MR, Nazari-Alam A, Motamedifar M. Molecular typing of methicillin-resistant and methicillin-susceptible *Staphylococcus aureus* isolates from Shiraz teaching hospitals by PCR-RFLP of coagulase gene. *Iran J Microbiol* 2014;6(4):246-52.
- Hookey JV, Richardson JF, Cookson BD. Molecular typing of *Staphylococcus aureus* based on PCR restriction fragment length polymorphism and DNA sequence analysis of the coagulase gene. *J Clin Microbiol* 1998;36(4):1083-9.
- Janwithayanuchit I, Ngam-Ululert S, Paungmoung P, Rangsiyanuntr W. Epidemiologic study of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* by coagulase gene polymorphism. *Sci Asia* 2006;32:127-32.
- Aslantaş Ö, Demir C, Türütoglu H, Cantekin Z, Ergün Y, Doğruer G. Coagulase gene polymorphism of *Staphylococcus aureus* isolated from subclinical bovine mastitis. *Turk J Vet Ani Sci* 2007;31(4):253-7.
- Moon JS, Lee AR, Kang HM, Lee ES, Joo YS, Park YH, et al. Antibiogram and coagulase diversity in staphylococcal enterotoxin-producing *Staphylococcus aureus* from bovine mastitis. *J Dairy Sci* 2007;90(4):1716-24.
- Sanjiv K, Kataria AK, Sharma R, Singh G. Epidemiological typing of *Staphylococcus aureus* by DNA restriction fragment length polymorphism of coa gene. *Veterinarski Arhiv* 2008;78(1):31.
- Yaşar Tel O, Bozkaya F. Identifying the bacteria causing ovine gangrenous mastitis and detection of *Staphylococcus aureus* in gangrenous milk by PCR. *Kafkas Univ Vet Fakültesi Dergisi* 2012;18(3):401-6.
- Güler L, Ok U, Gündüz K, Gülcü Y, Hadimli HH. Antimicrobial susceptibility and coagulase gene typing of *Staphylococcus aureus* isolated from bovine clinical mastitis cases in Turkey. *J Dairy Sci* 2005;88(9):3149-54.
- Talebi-Satou R, Ahmadi M, Saci HD. Restriction fragment length polymorphism genotyping of human *Staphylococcus aureus* isolates from two hospitals in Urmia region of Iran using the coa gene. *Jundishapur J Microbiol* 2012;5(2):416-20.
- Tiwari HK, Sapkota D, Gaur A, Mathuria JP, Singh A, Sen MR. Molecular typing of clinical *Staphylococcus aureus* isolates from northern India using coagulase gene PCR-RFLP. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 2008;39(3):467-73.
- Boswahi SS, Udo EE, Al-Sweih N. Shifts in the clonal distribution of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in Kuwait Hospitals: 1992-2010. *PLoS One* 2016;11(9):e0162744.

Genetic diversity of Staphylocoagulase genes (*Coa*) among methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* isolates at clinical specimens of blood and urinary infections

Mehrdad Mohammadi M.Sc.*
Jamshid Faghri Ph.D.

Department of Microbiology,
Faculty of Medicine, Isfahan
University of Medical Sciences,
Isfahan, Iran.

Abstract

Received: 05 Mar. 2019 Revised: 14 Mar. 2019 Accepted: 14 Jul. 2019 Available online: 22 Jul. 2019

Background: *Staphylococcus aureus* is a common pathogen in human that can be the cause of a wide range of infectious diseases including bacteremia, pneumonia, cellulitis, and osteomyelitis and skin and soft tissue infections. The coagulase enzyme is one of the most important virulence factors of this bacterium. The polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) *Coa* pattern is one of the molecular base typing methods. Molecular typing plays an important role in epidemiological studies of nosocomial infection, such as methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) infection. The PCR-RFLP *Coa* gene technique provides a useful preliminary method to monitor variations in MRSA populations. We were done *Coa*-RFLP typing according to the method of Hookey et al., with some modifications.

Methods: In this cross-sectional study, one-hundred fifty isolates of *S. aureus* from urine and blood samples of patients that collected from educational hospitals of Imam Hossein and Al Zahra Isfahan University of Medical Sciences, Iran, from February 2018 to October 2018 were analyzed. After bacterial confirmation of isolates by *Coa* gene in polymerase chain reaction (PCR) technique, to perform coagulase gene typing, the repeated units encoding hypervariable regions of the coagulase gene of *S. aureus* were amplified by PCR. This was followed by AluI restriction enzyme digestion and analysis of restriction fragment length polymorphism (RFLP) patterns.

Results: Of 150 samples, 45 isolated of *S. aureus* were confirmed by biochemical methods. Of previous positive samples, 36 (80%) isolates carried *Coa* gene. Two different genotypes of *Coa* gene were obtained that include bp680 fragment in 20 specimens and bp750 fragment in 16 specimens. After enzymatic digestion by AluI restriction enzyme for RFLP, four different restriction patterns were obtained that including, the 280+400 pattern in 16 specimens (44.4%), 280+470 pattern in 7 specimens (19.4%), 340+340 pattern in 6 specimens (16.6%) and 750 patterns without digestion were in 7 specimens (19.6%).

Conclusion: Using the present experiments, it was determined that the PCR-RFLP pattern, 280+400, was the dominant pattern in the *Staphylococcus aureus* samples isolated in Isfahan.

Keywords: coagulase, cross-sectional studies, genotype, polymerase chain reaction, *staphylococcus aureus*.

* Corresponding author: Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Azadi Sq, Hezar Jerib St, Isfahan, Iran.
Tel: +98-31-37929021
E-mail:
mehrdad.mohammadi1984@gmail.com